

Biopsia mamaria estereotáctica

Fecha: _____ Llegada: _____ Lugar: _____

Dirección: _____

Notas: _____

Acerca de

La biopsia estereotáctica de mama se realiza para extraer cantidades muy pequeñas de tejido de un área sospechosa en las mamas. Los bultos o anomalías en las mamas suelen detectarse mediante mamografía u otros estudios de imagen. Sin embargo, no siempre es posible determinar a partir de estas pruebas de imagen si un bulto es benigno (inofensivo) o canceroso.

Se realiza una biopsia estereotáctica de mama para extraer algunas células de tejido de un área sospechosa en la mama y luego un patólogo las examina bajo el microscopio para determinar un diagnóstico. Una biopsia estereotáctica de mama no está diseñada para extirpar toda la lesión (anomalía).

El examen de mama es mínimamente invasivo y permite a los radiólogos ayudar a diagnosticar anomalías en las mamas.

Se realiza una biopsia estereotáctica de mama cuando una mamografía muestra una anomalía mamaria, como:

- Una masa sólida sospechosa
- Microcalcificaciones, un pequeño grupo de pequeños depósitos de calcio
- Una distorsión en la estructura del tejido mamario
- Un área de cambio tisular anormal
- Una nueva masa o zona con depósitos de calcio en el lugar donde se realizó una cirugía anterior

Preparativos

Coma y beba como de costumbre antes de su procedimiento. Puede conducir tanto para ir como para regresar de su cita.

El día de su biopsia mamaria estereotáctica, se le pedirá que se desnude de la cintura para arriba, por lo que se recomienda llevar ropa de dos piezas. Use sostén que le quede bien ajustado.

Las mujeres deben informar a su radiólogo si existe alguna posibilidad de que estén embarazadas. No deben usar desodorante, talco, loción ni perfume en las axilas ni en los senos el día de la biopsia estereotáctica de mama.

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con una enfermera orientadora de SMIL al 480.425.5057.

Medicamentos de venta libre

El uso diario de los siguientes medicamentos de venta libre puede aumentar su riesgo de sangrado durante el procedimiento.

- Medicamentos antiinflamatorios como el Ibuprofeno, Aleve, Excedrin y Advil
- Medicamentos para la artritis o la migraña, como el Naproxeno, el Meloxicam y el Voltaren (Diclofenaco)
- Vitamina E, cúrcuma, aceite de pescado o de krill, omega 3



Atención de calidad superior gracias a técnicas avanzadas de imágenes médicas